



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 26-10-2021

ମୟୂରଭଞ୍ଜ(ଓଡ଼ିଶା) - :2021-10-26 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2021-10-27	2021-10-28	2021-10-29	2021-10-30	2021-10-31
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	31.0	31.0	31.0	31.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	85	82	70	65	70
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	59	61	55	48	42
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	7.8	10.4	9.5	8.9	7.1
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	45	243	243	248	255
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ (ଅଙ୍କ)	1	2	1	0	2

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଶୁକ୍ଳ ରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନର ବେଗ ୭.୧ ରୁ ୧୦.୪ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦.୦°C ରୁ ୩୧.୦°C ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୧.୦°C ରୁ ୨୨.୦°C ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ସକାଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୫ ରୁ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ୪୨ ରୁ ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ରବି ଫସଲ ଯଥା ଚିନାବାଦାମ, ମକା ଏବଂ ଚୋରିଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ । ଏବେ ପନିପରିବା ଯଥା କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲ (ବନ୍ଧାକୋବି, ବିଳମ୍ବ କିସମ ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକଲି), ବାଇଗଣ, ଚମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଲଗାଇବାର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଅଟେ । ପନିପରିବା ଯଥା ଗାଜର, ମୂଳା, ବିଳମ୍ବ କିସମ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଦି ଲଗାନ୍ତୁ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଗୋଲାପରେ କାଣ୍ଡୁକାଣ୍ଡ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଫୁଲ ହେବା ସହିତ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆକାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ । ନର୍ସରୀରେ କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗାରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଧାନରେ ଚକଡା ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ୩୦ ଗ୍ରାମ ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍+ଆସେଫେଟ୍ କିମ୍ବା ୫ ଗ୍ରାମ ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ୍ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।

ଗସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଗସ୍ୟ	ଗସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
------	----------------------------

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ରୁଆ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭ ରୁ ମଞ୍ଜି ପାକଳ (୯ – ୧୩ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ପୂରଣ ରୁ ଅମଳ ହେବା (୧୭ – ୧୭ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ମଞ୍ଜି ପାଚିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଜମି ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ । ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକରକୁ ୨୦ ମିଲି Chlorantraniliprole ୧୮.୫ ଏସ.ସି. କିମ୍ବା ୪୦୦ଗ୍ରାମ Cartrap Hydrochloride ୫୦% ଏସ.ପି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ପାଗରେ ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକରକୁ ୨୦୦ଗ୍ରାମ flonicamide ୫୦% WG କିମ୍ବା ୪୦ ଗ୍ରାମ thiomethoxam ୨୫% WG ଔଷଧ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଧାନରେ ଆଛାଦ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକରକୁ ୪୦୦ ମିଲି Hexaconazole ୫% + Validamycin ୨.୫% SC ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ହିସାବରେ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମିଲି Propiconazole ୧୩.୯% + Difenconazole ୧୩.୯% EC ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ମିଲି ମିଶ୍ରିତ କବକ ନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଧାନରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୮-୧୦ ଧାଡ଼ି ଅନ୍ତରରେ ଆଲି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ୩୦ ଗ୍ରାମ ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍+ଆସେଫେଟ୍ କିମ୍ବା ୫ ଗ୍ରାମଡାଇନୋଟେଫୁରାନ୍ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।
ମକା	ମକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକଳ ରୁ ଅମଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ପାକଳ ମକା ଅମଳ କରି ଖରା ରେ ୪-୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାନ୍ତୁ ।
ମସୁର/ହରଡ଼	ବୁଣା ଯାଇଥିବା ହରଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗାୟ ବୃଦ୍ଧି ରୁ କଢ଼ (୧୫ – ୧୭ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ହରଡ଼ ରେ ପାତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ହରଡ଼ ରେ ପାତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକରକୁ ୪୦୦ ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ ୫୦% + ସାଇପରମେଥୁନ ୫% ଇସି କିମ୍ବା ୪୦୦ ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ ୫୦% ଇସି କାଟନାଶକ ଔଷଧ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଟମାଟର	ବିଲାତି ବାଇଗଣ ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଚାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ତଲିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ । ବିଲାତି ବାଇଗଣ ର ଉନ୍ନତ କିସମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଉତ୍କଳ ରାଜା, ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତଲି ପକେଇବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିଲୋ ମଞ୍ଜି ରେ ୧ଗ୍ରାମ Bavistin ସହିତ ୨ ଗ୍ରାମ Thiram ଔଷଧ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମି ରେ ଚାଷ ପାଇଁ ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର ତଲି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ତଲି ପଟାଳି ଗାମିଟର ଲମ୍ବା, ୧ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ ୧୫ ସେମି. ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଷା ଓ ଖରା ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଲି ପଟାଳି ଉପାରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତୁ ।
ବନ୍ଧାକୋବି	ବନ୍ଧାକୋବି ତଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାରୁ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ତଲି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ । ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ଏକରକୁ ୨୦୦ଗ୍ରାମ ବିହନ ତଲି ପକାନ୍ତୁ । ବନ୍ଧା କୋବି କିସମ Golden acre, Pride of India ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିଲୋ ମଞ୍ଜି ରେ ୧ଗ୍ରାମ Bavistin ସହିତ ୨ ଗ୍ରାମ Thiram ଔଷଧ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମି ରେ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଖା ପାଖି ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର ତଲି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ତଲି ପଟାଳି ଗାମିଟର ଲମ୍ବା, ୧ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ ୧୫ ସେମି. ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଷା ଓ ଖରା ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଲି ପଟାଳି ଉପାରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତୁ ।
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲ କୋବି ତଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଫୁଲ କୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ତଲି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ । ଫୁଲ କୋବି ପାଇଁ ଏକରକୁ ୨୦୦ଗ୍ରାମ ବିହନ ତଲି ପକାନ୍ତୁ । ଫୁଲକୋବି କିସମ K-1, Pusa early synthetic and Pusa early Kuanri ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିଲୋ ମଞ୍ଜି ରେ ୧ଗ୍ରାମ Bavistin ସହିତ ୨ ଗ୍ରାମ Thiram ଔଷଧ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଜମି ରେ ଚାଷ ପାଇଁ ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର ତଲି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ତଲି ପଟାଳି ଗାମିଟର ଲମ୍ବା, ୧ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ ୧୫ ସେମି. ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ଷା ଓ ଖରା ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଲି ପଟାଳି ଉପାରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତୁ ।